

Hurrá, nyaralunk!



szöveg: dr. Szilágyi Noémi
fotók: CEVA-PHYLAXIA Zrt., www.sxc.hu
www.dap-feromon.hu, www.feliway.hu

Hét ágra süt a nap, üde zöld a táj – nincs is kellemesebb, mint beülni az autóba, hogy távol a város zajától, egy erdőben vagy egy tóparton kószálva, a hétvégi telken szőszmötölvé töltjük szabadidőnket. A kutyák többsége kitörő örömmel csatlakozik egy ilyen szabadtéri programhoz, hiszen a játék, a futkározás, a fürdés öröme ritkán adatik meg a városi kutyáknak. Ha pedig mindezt a gazda társaságában tehetik, az már igazán maga a mennyország! A fenti eszmefuttatás kritikusi pontja az utazás. Vannak ugyanis olyan kutyák, akik nyilvánvalóan szenvednek az autózás során.

Az **utazási betegség** hátterében a belső fülben található egyensúlyozószerv túlzott érzékenysége áll. Rossz közérzet, izzadás, fejfájás, émelygés-hányás jellemzi – emberben és állatban egyaránt. Ráadásul kedvencünk kiválóan emlékszik a kellemetlen eseményekre, így rövid időn belül az utazási betegség tünetei kiegészülnek az utazási pánik tüneteivel is.

Az **utazási pánik** az utazástól, leggyakrabban

az autózástól és az autótól való félelmet jelenti. Hátterében meghúzódhat a tapasztalat hiánya, vagy egy korábbi kellemetlen élmény. Riasztó emlék lehet egy baleset, de az is, ha kedvencünk csak az állatorvoshoz menet szokott autózni. A leggyakoribb pániktünetek a nyálzás, a hányás, a lihegés, a nyugtalanság és a remegés. Gyakori, hogy a kutya „megtagadja” a beszállást, vagy az első adandó alkalommal kiszökik. Nem meglepő, hogy sokan inkább teljesen lemondanak a nyaralásról, csak hogy elkerüljék az autózással járó bonyodalmakat. Sokak számára meglepő lehet, hogy a macskákat szintén érintheti mind az utazási betegség, mind az utazási pánik. Náluk a panaszos nyávogás, a hányás, valamint az utazóketrebe való piszkítás a leggyakoribb tünet.

Létezik megoldás?!

Az **utazási betegség** kezelésére antihisztaminok vagy hányáscsillapítók vehetők igénybe, sok esetben korlátozott sikerrel. Ennek egyik oka az lehet, hogy a kutyában már kialakult az utazási betegség, amely ellen természetesen hatástalanok az előbbi gyógyszerek. Figyeljünk arra is, hogy a legtöbb készítményt nem javasolják fiatal, vemhes vagy szoptató állatoknak,

illetve máj- vagy szívbetegség gyanúja esetén. Érdemes kikérni kezelő állatorvosuk tanácsát, valamint még a vásárlás előtt elolvasni a gyógyszer alkalmazási útmutatóját!

Az **utazási pánik** esetében a kutya félelemérzetének megszüntetése a legfontosabb. A félelem ugyanis egy olyan mentális állapot, amikor a kutya egyáltalán nem fogékony új ismeretekre, tehát nem is tanítható eredményesen. Márpedig meg kell tanulnia, hogy félelemre semmi ok, sőt az utazás akár kellemes élmény is lehet, vagyis pozitív asszociációkat kell kialakítani a kutyában. A kereset cikkünkben olvasható fogások alkalmazásával Ön is viselkedésterápiát végez! Látható, hogy egyáltalán nem bonyolult, csak a józan ész szabályait kell követni. A viselkedésterápiát kiválóan kiegészíti a CEVA Santé Animale által kifejlesztett, az anyakutya úgynevezett „appeasing” feromonjának szintetikus változatát tartalmazó **D.A.P.® Spray**.

A kutyákhoz képest a macskák esetében korlátozottak a viselkedésterápia nyújtotta lehetőségek, ugyanakkor a tapasztalatok szerint sokat segíthet a macska főfajtájéki, azaz facialis feromonjának F3 frakcióját tartalmazó **FELIWAY® Spray**.



Valami van a levegőben, ami kiegyensúlyozottabbá teszi kedvenceinket!

Az „appeasing” feromon szorongásoldó hatásának köszönhetően a **D.A.P.®** alkalmazásakor a kutya aggodás helyett nyitottan és

érdeklődve fordul az őt körülvevő világ felé, anélkül, hogy bódult vagy álmos lenne. Ebből adódóan a **D.A.P.®** igénybe vehető minden olyan helyzetben, ami „kutyakörökben” aggodalomra adhat okot, pl. utazási pánik, elválás az anyakutyától és a testvérektől,

új gazda, új családtag (kisbaba, nagyszülő, új házi kedvenc), költözés, kutyapanzió, látogatás az állatorvosi rendelőben, tűzijáték, mennydörgés, kutyakiállítás, egyedüllét, vendégség, változás a napirendben stb). Kísérletek bizonyítják, hogy a kutya „appeasing” feromon csitító-nyugtató, ugyanakkor bátorító hatása kölyök és felnőtt állatban egyaránt érvényesül. Az elektromos párolgató és a spray kiszerezés kiváloán kiegészítheti egymást, akár ugyanazon egyed esetében is. A **D.A.P.®** hatóanyaga szigorúan fajspecifikus, azaz sem az emberre, sem más állatra nincs semmiféle hatása. A termék mindkét kiszerezése állatorvosi rendelőben és patikákban kapható. A **D.A.P.® Spray és Elektromos párolgató** alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokról, valamint a kutyák viselkedészavarairól és a viselkedésterápia alapjairól bővebben is olvashat a www.dap-feromon.hu oldalon. A macskatulajdonosoknak ajánljuk a www.feliway.hu oldalt, ahol a macskák viselkedéséről és a **FELIWAY® Spray és Elektromos párolgató** alkalmazásáról található információkat. **További kérdéseivel forduljon bizalommal állatorvosához vagy a CEVA-PHYLAXIA Zrt. munkatársaihoz!** (x)

Néhány jó tanács autózáshoz

► Igyekezzen élvezetessé tenni az utazást a kutya számára, hogy kellems asszociációk alakulhassanak ki benne!

► Mindig alaposan dicsérje meg a kutyát, ha megfelelően viselkedett!

► Először álló autóval gyakorolják a be- és kiszállást, valamint a bentlételet.

► Ezt követően már rövidebb utakra is mehetnek, amelyek jó, ha a kutya számára élvezetes eseménnyel, pl. sétával vagy játékkal végződnek. Fokozatosan növelje az autózás időtartamát!

► Főleg kezdetben kerülje a hangoskodást, az ajtók csapkodását, a hirtelen fékezéseket!

► Mind kutyája, mind pedig az Ön számára biztonságos megoldást jelenthet egy megfelelő méretű utazóketrec vagy szállítódoboz.

Mielőtt beszállna

► Főleg a hosszabb utak előtt ügyeljen arra, hogy kutyája legfeljebb valami könnyen emészthetőt kapjon enni! Amennyiben az eb hányásra hajlamos, akkor az utazás előtt egyáltalán ne etesse! A vizet viszont ne vonja meg tőle! Kb. negyedórával a beszállás előtt fújjon **D.A.P.® Spray-t** az utazóketrecbe, a kutya plédjére vagy közvetlenül az autóba! Egy alkalommal 8-10 fújásnyi mennyiség szükséges, amit másfél-két óránként vagy a hatás csökkenésekor meg lehet ismételni. Amennyiben állatorvosa egyéb készítményt is javasol, kövesse a tanácsát!

Az utazás alatt

► Halk, megnyugtató hangon beszéljen a kutyushoz, és – ha ez nem balesetveszélyes – időnként simogassa meg!

► Időről időre engedjen friss levegőt az utastérbe! Soha ne hagyja egyedül a kutyáját az autóban! Hosszabb út esetén kb. kétóránként tartson pihenőt, amikor a kutya kiszállhat, ihat és elvégezheti a dolgát. Ilyenkor lehetőség van újabb adag **D.A.P.® Spray-t** fújni a légterbe.

